

Ο γιατρός σας θα σας συστήσει έναν **τακτικό** έλεγχο **κάθε 6 έως 12 μήνες** της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων, για όσο διάστημα παίρνετε το Protelos®.

Ημερομηνία έναρξης της αγωγής:

□□ / □□ / 20□□

Επίσκεψη παρακολούθησης:

□□ / □□ / 20□□

□□ / □□ / 20□□

□□ / □□ / 20□□

□□ / □□ / 20□□



ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

PROTELOS[®]
Strontium ranelate

Αγαπητέ ασθενή,

Ο γιατρός σας, σας χορήγησε **Protelos[®] (ρανελικό στρόντιο)** για την αντιμετώπιση της σοβαρής οστεοπόρωσης.

Αυτή η κάρτα ασθενή περιέχει **σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια** σχετικά με πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες, που πρέπει να γνωρίζετε πριν και κατά τη διάρκεια της αγωγής με Protelos[®].

- Παρακαλείσθε όπως δείξετε την κάρτα αυτή σε οποιονδήποτε γιατρό ή νοσηλευτή που ασχοληθεί με την αγωγή σας και ζητήστε του να συμπληρώσει στην πίσω πλευρά.
- Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης, το οποίο περιλαμβάνεται σε κάθε συσκευασία Protelos[®] για περαιτέρω πληροφορίες.

Αν εκδηλώσετε οποιαδήποτε από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακαλείσθε όπως συμβουλευθείτε άμεσα το γιατρό σας.

Όνοματεπώνυμο γιατρού:

Τηλέφωνο γιατρού:

Όνοματεπώνυμο ασθενή:

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν να πάρετε Protelos®

Το Protelos® ενδέχεται να αυξήσει τους καρδιαγγειακούς κινδύνους, τους κινδύνους φλεβικής θρόμβωσης και αλλεργικής αντίδρασης.

Δεν πρέπει να πάρετε το Protelos®:

- Εάν σας έχει διαγνωστεί καρδιακή προσβολή ή στηθάγχη (αποκλεισμός των αιμοφόρων αγγείων προς την καρδιά), ή εγκεφαλικό επεισόδιο (αποκλεισμός των αιμοφόρων αγγείων προς τον εγκέφαλο), ή παροδική ισχαιμική προσβολή (“mini-stroke”).
- Εάν έχετε ή είχατε προβλήματα κυκλοφορίας του αίματος στα πόδια σας (περιφερική αρτηριοπάθεια) ή εάν είχατε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στις αρτηρίες των ποδιών σας.
- Εάν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση, που δεν ρυθμίζεται με την αγωγή σας.
- Σε περίπτωση που έχετε ή εάν είχατε θρόμβο στο αίμα (για παράδειγμα, στα αγγεία του αίματος στα πόδια ή στους πνεύμονες).
- Σε περίπτωση που έχετε μόνιμη ή παρατεταμένη ακινησία όπως αν είστε χρήστης αναπηρικής καρέκλας ή καθηλωμένος στο κρεβάτι ή αν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση ή αν αναρρώνετε από χειρουργική επέμβαση. Ο κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης μπορεί να είναι αυξημένος στην περίπτωση μακροχρόνιας ακινητοποίησης.
- Σε περίπτωση αλλεργίας στο ρανελικό στρόντιο ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό του Protelos®

Κατά τη διάρκεια της αγωγής σας με Protelos® αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή εάν εκδηλώσετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

- Αιφνίδιοι έντονοι πόνοι στο στήθος που φτάνουν στον αριστερό σας βραχίονα, σαγόني, στομάχι πλάτη και/ή ώμους, καθώς μπορεί να συνδέονται με καρδιακή προσβολή. Άλλα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία/εμετό, εφίδρωση, δύσπνοια, αίσθημα παλμών, (έντονη) κόπωση και/ή ζάλη.
- Επώδυνο οίδημα στα πόδια, αιφνίδιος πόνος στο στήθος ή δυσκολία στην αναπνοή, καθώς μπορεί να συνδέονται με θρόμβωση στα πόδια ή στους πνεύμονές σας.
- Οποιαδήποτε αλλεργική αντίδραση όπως οίδημα του προσώπου, της γλώσσας, ή του λαιμού, δυσκολία στην αναπνοή ή την κατάποση, δερματικό εξάνθημα (π.χ. εμφάνιση στον κορμό του σώματος κηλίδων κόκκινου χρώματος με μορφή στόχου, ή κυκλικές πλάκες συχνά με φλύκταινες στο κέντρο, ή συμπτώματα όπως της γρίπης και εξάνθημα στο πρόσωπο).
- Θα πρέπει να διακόψετε άμεσα το Protelos®.

Μιλήστε με το γιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας:

- Εάν έχετε κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου, αυτό περιλαμβάνει υψηλή αρτηριακή πίεση, υψηλή χοληστερόλη, διαβήτη και/ή κάπνισμα. Η καρδιακή προσβολή εκδηλώνεται συνήθως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρδιοπάθεια.
- Εάν έχετε κίνδυνο εμφάνισης θρόμβων στο αίμα.